



DIFIPAQ 50 PLAQUETTE COULÉE 45G DIFENACOUM

FICHE TECHNIQUE

GAMME
COLLECTIVITÉS



DESCRIPTIF PRODUIT

Matière active : **Difénacoum 0,005 %**
Contient un agent amérissant (0,01 %)
A.M.M FR-2014-0064 - «DIFIPAQ 50»

Support :	Plaquette hydrofuge coulée
Couleur :	Bleu
Cibles	Rat et souris
Usages autorisés :	Grand public et les professionnels non spécialistes 3D.
Lieu d'utilisation :	interieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles

INFORMATIONS COMMERCIALES

Produit adapté pour les collectivités dans le cadre d'une distribution à la population. 40 sachets zippés étanches et étiquetés sont inclus pour permettre la remise d'un volume conforme à la législation biocide (moins de 1,5kg) et assurer un haut niveau d'information pour les utilisateurs.

Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et souris. Process de fabrication coulé pour une très bonne résistance à l'humidité.

A base de Difénacoum :

- Efficace par ingestion unique ou consommations répétées.
- antidote disponible (vitamine K1) et sous contrôle médical

L'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.

Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

TOXICOLOGIE

Non classé

INDICATIONS POUR LE MEDECIN : contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 devrait être nécessaire pendant une longue période. **Centres antipoison** : INRS 01 45 42 59 59

MÉTHODE D'APPLICATION

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles.

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblée. Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux (risques d'intoxication secondaire).

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

Doses d'utilisation :

Contre les rats : 45 à 90g tous les 5 à 10 mètres :
contre les souris : 45g tous les 1 à 2 mètres. Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés.

RA200/8860

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.

avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1
Mise à jour le 20.03.15

Distribué par : TIXO/NGA

ZAC DES ENTREPOTS - 10 Rue de l'Emaillerie - BAT K301 - 02200 SOISSONS

Tél : 03 23 76 40 40 - Fax : 03 23 53 31 39

email : tixo@wanadoo.fr - contact@nga.fr - www.tixo-nga.fr